

Załącznik 4

Propozycja klasyfikowania zmian typowych dla osteochondrozy

Określenie, której kończyny opis dotyczy:

- PP – prawa kończyna piersiowa
- LP – lewa kończyna piersiowa
- PT – prawa kończyna miedniczna
- LT – lewa kończyna miedniczna

Określenie, którego stawu opis dotyczy:

- P – staw pęcinowy
- S – staw stepu
- K – staw kolanowy

Lokalizacja zmiany w stawie:

staw pęcinowy:

- GP – grzebień pośrodkowy kości śródręcza/śródstopia III
- PP(P) – podstawa kości pęcinowej (przód)
- PP(T) – podstawa kości pęcinowej (tył)

staw stepu:

- KB – kostka boczna kości piszczelowej
- KP – kostka przyśrodkowa kości piszczelowej
- GP – grzebień pośrodkowy kości piszczelowej
- BB – bloczek boczny kości skokowej
- BP – bloczek przyśrodkowy kości skokowej

staw kolanowy:


- GB – grzebień boczny bloczka kości udowej
- GP – grzebień przyśrodkowy bloczka kości udowej
- R – powierzchnia stawowa rzepki
- ChW – chrząstka wzrostowa kości

Stopień nasilenia zmian typowych dla osteochondrozy:

- 0 – Brak zmian
- 1A – Ogniskowe ubytki i zagęszczenia cienia kości na wysokości miejsca zamknięcia chrząstki wzrostowej kości. Nadbudowa kości w miejscu przyczepu torebki stawowej.
- 1B – Minimalne spłaszczenie cienia kości w strefie podchrzęstnej.
- 2 – Wyraźny ubytek cienia kości w strefie podchrzęstnej manifestujący się wgłębieniem w prawidłowej linii granicznej kości.
- 3 – Obecność wolnego fragmentu kostno-chrząstnego w jamie stawu.




Ryc. 1. Wolny odłamek kostno-chrzęstny pochodzący z tylnej krawędzi podstawy kości pęcinojowej prawej kończyny piersiojowej.




Ryc. 2. Wolny odłam kostno-chrząstny pochodzący z przedniej krawędzi podstawy kości pęcinowej lewej kończyny miednicznej.




Ryc. 3. Wolny odłam kostno-chrzęstny pochodzący z grzebienia pośrodkowego kości piszczelowej oraz nieznacznego stopnia spłaszczenie cienia kości w strefie podchrzęstnej w obrębie bloczka przyśrodkowego kości skokowej lewej kończyny miednicznej.



Ryc. 4. Ogniskowe ubytki i zagęszczenia cieniu kości na wysokości miejsca zamknięcia chrząstki wzrostowej kości. Nadbudowa kości w miejscu przyczepu torebki stawowej oraz minimalne spłaszczenie cieniu kości w strefie podchrzęstnej w obrębie grzebienia pośrodkowego kości śródręcza III lewej kończyny górnej.



Ryc. 5. Wolny odłam kostno-chrzęstny pochodzący z kostki bocznej kości piszczelowej prawej kończyny miednicznej.



Ryc. 6. Wolny odłam kostno-chrzęstny pochodzący z grzebienia bocznego bloczka kości udowej prawej kończyny miednicznej.